Медицинский Центр Мед-Амулет

Кабинет ультразвуковой диагностики

КАРТА ЭХОДОППЛЕРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№ 513 Фамилия Бурмистрова Имя Виктория Отчество 123 см, 21 кг BSA (м2) 0,84

Возраст 8 лет 6 мес Дата исследования 13.08.2026

Левый желудочек КСР (см) 2,8 КДР (см) 4,8 Z-score КДР КСО (мл) 30 КДО (мл) 106 i КДО (мл/м2) 126 УО (мл) 76

ФВ (%) 72 МЖП_d (мм) 8 Z-score МЖП ЗСЛЖ_d (мм) 8 Z-score ЗСЛЖ

Митральный клапан створки тонкие, подвижные D кл. (мм) 22

Регургитация менее 1+ Пик. град. (мм Hg) 4 D отверстия (мм) Z-score

Ср. град. (мм Hg) S отверстия (см2)

Левое предсердие D (мм) 23 Z-score **Легочные вены** дренируются в левое предсердие

Аорта отходит от ЛЖ, дуга левая, кровоток в брюшной Ао магистральный, коронарные артерии отходят типично

Восх. (мм) 23 Дуга Ао, прокс (мм) 21 Дуга Ао, дист (мм) Перешеек (мм) 14 Z-score истм.

Z-score восх_Ао 2,82 Пик. град. перешеек (мм Hg) 11

Клапан нео-Ао 3-х створчатый, створки тонкие, подвижные, неполное смыкание в диастолу, vc AR 6 mm D кл. (мм) 26

Регургитация 2,5+ Пик. град. (мм Hg) 6 Z-score 6,79

Правый желудочек КДР 27 мм, не увеличен Выводной отдел ПЖ: не сужен, диаметр 17 мм

Сист. Р(ПЖ) (мм Hg) 100 **ВПВ** дренируется правильно в ПП

Правое предсердие 37 мм, Z 2,32; увеличено **НПВ** дренируется правильно в ПП

Трикуспид. клапан створки тонкие, подвижные, vc 3,5 mm D кл. (мм) 25

Регургитация 1,5-2+ Пик. град. (мм Hg) 3,5 Z-score

Кондуит Hancock 14: мм от ПЖ, ветви ЛА - визуализация затруднена

Ствол (мм) Правая ЛА (мм) Левая ЛА (мм) Z-score ПЛА Z-score ЛЛА

Диаст. Р(ЛА) (мм Hg)

Клапан кондуита створки тонкие, подвижные, , суммарный PG ПЖ-ЛА 95 mmHg (в дистальной части конд-та) D кл. (мм) 14

Регургитация min Пик. град. (мм Hg) 14 Z-score

Митрально-аортальный фиброзный контакт присутствует **Септально-аортальный контакт** присутствует

Межжелудочковая перегородка Заплата фиксирована, сброса крови через заплату нет, синус Вальсальвы 31 мм (Z 5,07)

Межпредсердная перегородка интактна

Перикард без особенностей **Плевр. полости** без особенностей

Дополнительные особенности ВОЛЖ 21 мм пересекает поперечн мышечный тяж, соединенный с папиллярн мышцей, не создающий препятствия кровотоку. AR: PHT AR 204 ms
Локальных зон гипокинезии ЛЖ не выявлено. Соотн. d LVOV 21 mm/jet AR 10 mm = 43%

Заключение

Сост. п/о Никаидо по поводу ТМА с ДМЖП, ст ЛА. (17.10.18), п/о замены кондуита на Hancock 14 мм (18.11.20). Выраженный стеноз кондуита с PG ПЖ-ЛА 95 mmHg. Нед-ть нео-АоКл 2,5+. Сброса ч/з заплату на ДМЖП нет. Эксцентрич ГЛЖ с ФВ 72 %. НТК 1,5-2+.

Врач Крюков В.А.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МИР В НАШИХ РУКАХ»